

BOLETÍN N°581

MES: SEPTIEMBRE

AÑO 2026

INFORMACIÓN PLUVIOMÉTRICA, NIEVES, FLUVIOMÉTRICA, ESTADO DE EMBALSES Y AGUAS SUBTERRÁNEAS.

CONTENIDO:

- 1. RESUMEN SITUACIÓN HIDROLÓGICA**
- 2. RESUMEN DE TABLAS Y GRÁFICOS, POR VARIABLE, ASOCIADAS A LAS ESTACIONES MÁS REPRESENTATIVAS CONTROLADAS**
 - 2.1 PLUVIOMETRÍA Y NIEVES**
 - 2.2 FLUVIOMETRÍA**
 - 2.3 EMBALSES**
 - 2.4 AGUAS SUBTERRÁNEAS**

Nota: Datos provisorios sujetos a modificación

SSD N°: 20606737

INTRODUCCIÓN

La Dirección General de Aguas (D.G.A.) pone a disposición su **Boletín Mensual de Información Hidrométrica**, que consolida los datos operativos de su red de monitoreo hidrológico crítica. Este documento proporciona información de cobertura nacional y carácter sintético, ofreciendo una visión integral de la situación hidrométrica con resolución temporal mensual y acumulada anual hasta la fecha de emisión.

La red hidrométrica se compone de una infraestructura distribuida de puntos de medición, que incluye estaciones fluviométricas, meteorológicas, nivométricas y piezométricas, además de incorporar los volúmenes almacenados en los principales embalses del país. Todos estos datos son generados, recopilados y mantenidos por este Servicio en el **Banco Nacional de Aguas (BNA)**.

Para acceder a un mayor nivel de detalle o realizar consultas técnicas sobre los datos presentados, se recomienda visitar el portal institucional de la D.G.A. en www.dga.mop.gob.cl, específicamente las plataformas denominadas Sistema Nacional de Información del Agua (SNIA) y el Sistema Hidrométrico en Línea. Es importante destacar que los valores publicados en este boletín son de carácter provisional, al tratarse de datos brutos no validados, los cuales se encuentran disponibles de forma permanente en los sistemas digitales antes mencionados."

I RESUMEN SITUACIÓN HIDROLÓGICA AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

Precipitaciones

Describiendo la condición sinóptica de la región las precipitaciones registradas durante septiembre ocurrieron en el contexto del desarrollo de un intenso evento de El Niño. En este mismo periodo los modelos indicaban un pronóstico de anomalías de temperatura oceánicas en la zona Niño 3.4 sobre 2.5 °C aproximadamente, lo cual es categorizado como excepcionalmente fuerte¹. Por otro lado, la oscilación antártica se mantuvo en índices negativos durante los primeros 15 días de septiembre aumentando la probabilidad de precipitaciones, mientras que la oscilación de Madden Julian presentó dos ventanas activas una breve al inicio del mes y otra persistente durante la segunda quincena, significando el aumento de la probabilidad de una configuración atmosférica favorable durante la segunda mitad de septiembre.

Visto lo anterior durante septiembre de 2026 se observaron numerosos eventos de precipitación a escala nacional. El primero de ellos se registró los primeros días de septiembre en la zona centro sur del país y posteriormente a partir del día 17 de septiembre se registraron precipitaciones en la región de Antofagasta y desde la región de Valparaíso hacia sur. Después a partir del día 22 de septiembre las precipitaciones se concentraron desde la región del Maule hasta la zona austral, dejando importantes acumulados de precipitaciones (Figura 2.1.1).

La comparación entre los registros acumulados a septiembre de 2026, representados por la curva azul, y los acumulados a septiembre de 2025, correspondientes a la curva verde, muestra que las precipitaciones registradas en lo que van del 2026 fueron de mayor magnitud en las macrozonas norte, centro y sur de preferencia. En la zona austral, en cambio, se observa un comportamiento dispar y donde las curvas presentan una cercanía entre ellas respecto a la magnitud inclusive la curva de la normal (Figura 2.1.2).

Como consecuencia de estos eventos, actualmente predominan condiciones de superávit pluviométrico inclusive sobre el 100% en las estaciones ubicadas en la zona norte del país hasta la región de Valparaíso (Figura 2.1.3). A partir de esta última región hasta Maule se visualizan condiciones mixtas, destacando como déficit mínimo de un 49% en Laguna Aculeo y un máximo de superávit de 67.8% en San Felipe. Entre las regiones de Ñuble y Biobío se observan condiciones mixtas, resultando con déficit menores al 10%, no obstante, entre la Araucanía y Los Ríos se visualizan condiciones de superávit de precipitaciones entre el 11% y 39% respectivamente.

La zona austral equivalente a las regiones de Aysén y Magallanes y la Antártica Chilena, se registraron condiciones mixtas, con un gran déficit pluviométrico en Coyhaique, cercano a un 30%, mientras que en Punta Arenas y Río Róbalo en Puerto Williams con superávit del 4% y 12% respectivamente.

¹ https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/?enso_tab=enso-sst_table

Cartas Sinópticas

Se realizó un análisis sinóptico tomando los datos de reanálisis de NCEP Climate Forecast System Version 2 (CFSv2), Saha, S., et al. 2011, seleccionando una muestra horaria de los eventos importantes de precipitación ocurridos durante septiembre de 2026. Las muestras estimativas de algunos eventos son las siguientes:

- 1 al 4 de septiembre: zona sur afectada
- 17 al 20 de septiembre: zona sur y austral afectada
- 22 al 25 de septiembre: zona norte, centro sur y austral.

La elección de las muestras (Figura 2.1.4) responde a un criterio subjetivo, priorizando la representación de las variables seleccionadas y su asociación con los registros de precipitación de la red hidrometeorológica de la Dirección General de Aguas (DGA). Este análisis tiene como objetivo visualizar el agua precipitable (PWAT) aportado al continente, los sistemas de baja presión (PRMSL) y temperatura asociados (Temp) y el comportamiento de los vectores de viento (UV), evidenciando la intensidad de los fenómenos meteorológicos.

Perfiles de Temperatura

Se desarrollaron perfiles verticales de temperatura (Figura 2.1.5) con radiosondeos obtenidos desde el portal de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) (<https://www.ncei.noaa.gov/access/metadata/landing-page/bin/iso?id=gov.noaa.ncdc:C00975>), para los radiosondeos de Antofagasta y Puerto Montt, con el fin de realizar una caracterización general de la isoterma cero en cada zona cercana a las localidades. La isoterma cero fue obtenida mediante el método desarrollado por Guo et al. (2021) el cual consiste en la interpolación entre los niveles de presión o niveles significativos identificando el nivel donde la temperatura cambia de signo de positivo a negativo.

Descripción de Eventos

Día 2 de septiembre

Durante el 2 de septiembre se observan dos bajas presiones relativamente compactas sobre el Pacífico suroriental, una ubicada aproximadamente entre 38°S y 42°S y cerca de 95°W y la otra a los 45°S, 75°W tocando el continente. Ambas se visualizan con circulación ciclónica mostrado por los vectores de viento en la carta UV y Temp, transportando el agua precipitable de magnitud aproximada de 30 kg/m² hacia el continente. En 500 hPa hacia el oeste las isohipsas presentan una ondulación con orientación general noroeste-sureste y alturas decrecientes hacia el sur, configurando una vaguada abierta.

La baja superficial se encuentra cerca del sector delantero de las vaguadas, donde el ascenso dinámico sería más probable. El gradiente de altura geopotencial aumenta hacia el extremo sur, aunque las isohipsas no aparecen tan comprimidas frente a Chile central.

En el campo térmico se aprecia aire más cálido al norte y aire frío al sur de 40–45°S. Los vectores sugieren transporte frío desde el sur y suroeste en la parte posterior de la baja, mientras que por delante del sistema aparece una componente más templada procedente de latitudes menores. La zona de encuentro y mezcla entre ambas masas se localiza principalmente sobre el océano, por lo que la organización frontal y las precipitaciones sobre Chile fueron relativamente acotadas.

El perfil de Puerto Montt del 2 de septiembre presenta la isoterma de 0 °C más baja de las cuatro fechas, situada a aproximadamente 1.459 m s. n. m. Cerca de la superficie, la temperatura se encuentra alrededor de 8 °C y disminuye hasta alcanzar 0 °C en torno a 1,5 km.

Día 18 de septiembre

En superficie, se observó la profundización de un centro de baja presión en torno a los 45°S y 85–90°W, acompañado de una vaguada frontal que se extendía hacia el norte hasta aproximadamente los 30°S en el nivel de 500 hPa. Esta configuración generó un descenso de las isohipsas hasta valores de entre 5.500 y 5.600 m. La circulación ciclónica en torno a la baja superficial favoreció el establecimiento de un flujo del noroeste en niveles bajos, intensificando el transporte de humedad desde latitudes tropicales hacia la zona central de Chile. Este aporte se manifestó mediante un filamento de agua precipitable con valores de entre 35 y 45 kg/m².

Desde el punto de vista térmico, el flujo prefrontal del noroeste produjo advección cálida sobre Chile central. La interacción entre la vaguada en altura, la baja presión en superficie y la circulación ciclónica asociada generó condiciones favorables para la ocurrencia de precipitaciones intensas.

Importante destacar que la vaguada identificada también fue responsable de la precipitación ocurrida en la región de Antofagasta, producto de la advección de agua precipitable desde la costa peruana con valores de 30 kg/m².

En relación a los perfiles de temperatura en esta fecha se observa un calentamiento importante de la troposfera baja respecto del día 2 en Puerto Montt. La primera isoterma de 0 °C asciende hasta aproximadamente 2.666 m s. n. m., es decir, cerca de 1.207 m más alta que el 2 de septiembre.

En la capa superficial aparece una pequeña inversión o capa estable. La temperatura aumenta levemente desde los niveles más bajos hasta aproximadamente 300–500 m, antes de comenzar a disminuir con la altura. Esta estructura puede asociarse con estabilidad de muy bajo nivel, efectos locales o una capa superficial desacoplada.

El perfil de Antofagasta se diferencia claramente de los perfiles de Puerto Montt. La primera isoterma de 0 °C se encuentra a aproximadamente **3.993 m s. n. m.**, alrededor de **1.327 m por encima** de la isoterma registrada el mismo día en Puerto Montt.

La capa baja se presenta considerablemente más cálida. La temperatura superficial se aproxima a 18 °C y aumenta hasta valores cercanos a 22 °C alrededor de 1,2 a 1,4 km, mostrando una inversión térmica bien definida. Sobre esa altura, la temperatura comienza a disminuir. Esta inversión inferior es compatible con una atmósfera estable en niveles bajos. En el norte costero de Chile, una inversión de este tipo puede asociarse con subsidencia anticiclónica y con la influencia de la capa límite marina.

Día 20 de septiembre

Este episodio correspondió al evento de mayor impacto sobre la zona centro-sur de Chile durante la secuencia analizada. En superficie, se observó una ciclogénesis madura frente a la costa, con un centro de baja presión de aproximadamente 1.000 a 1.005 hPa, ubicado cerca de los 45°S y 80°W.

En el nivel de 500 hPa, el sistema estuvo precedido por una vaguada sobre el océano Pacífico. Entre los 30° y 50°S, las isohipsas descendieron progresivamente desde los 5.800 hasta los 5.400 m, reflejando una marcada baroclinia y sugiriendo la presencia de una corriente en chorro activa en altura.

El acoplamiento entre la baja en superficie y la vaguada en altura intensificó la circulación ciclónica en los niveles bajos. Como resultado, se estableció un flujo acelerado del noroeste sobre el Pacífico, particularmente entre los 35° y 45°S, evidenciado en la mayor longitud de los vectores de viento frente al continente. Esta circulación favoreció el transporte de un río atmosférico orientado de noroeste a sureste, con valores de agua precipitable superiores a 40 kg/m². El corredor de humedad alcanzó la costa chilena entre los 35° y 45°S, aportando condiciones favorables para la ocurrencia de precipitaciones abundantes en la zona centro-sur del país. Desde el punto de vista térmico, el flujo prefrontal del noroeste produjo advección cálida sobre Chile central, con temperaturas de entre 15 y 20 °C. En contraste, al sur del sistema avanzó una masa de aire post-frontal más fría sobre la Patagonia, con temperaturas inferiores a 5 °C.

El perfil de temperatura en Puerto Montt del 20 de septiembre muestra un enfriamiento considerable respecto del 18 de septiembre. La primera isoterma de 0 °C desciende desde 2.666 hasta aproximadamente 1.665 m s. n. m., una reducción cercana a 1.001 m en dos días.

En superficie se observan temperaturas del orden de 9 a 10 °C, pero el enfriamiento con la altura es más rápido que el día 18. La isoterma relativamente baja sugiere el ingreso de una masa de aire frío proveniente del sistema frontal que afectó la región.

Día 23 de septiembre

Se aprecia en 500 hPa una vaguada desplazada hacia su oeste-suroeste: la inclinación hacia el oeste con la altura confirma un ciclón frontal baroclínico en profundización, cuyo eje se prolonga pegado a la costa y permite que la banda frontal se mueva hasta el norte, en su tránsito, todo el centro, la zona centro-sur y el sur. Coherente con ello, el agua precipitable exhibe una lengua de vapor de agua de 30–40 kg/m² en torno a 25–33°S que se aproxima a la costa entre las regiones del Maule y Los Lagos.

La carta de viento y temperatura completa el cuadro, con flujo prefrontal del norte advectando aire cálido sobre el centro y el norte chico y flujo sur postfrontal sobre el sur.

En relación al perfil de temperatura el día 23 de septiembre la isoterma vuelve a elevarse, alcanzando aproximadamente 2.325 m s. n. m. Esto representa un ascenso cercano a 660 m respecto del día 20, aunque la isoterma continúa unos 341 m por debajo del nivel observado el día 18.

El perfil superficial muestra temperaturas cercanas a 9 a 10 °C. En los primeros cientos de metros aparece una leve irregularidad o inversión débil, seguida de un descenso térmico continuo. Entre aproximadamente 1 y 4 km, la columna vuelve a ser relativamente templada, lo cual explica el ascenso del nivel de congelación.

Desde aproximadamente 4 km hasta la parte superior del perfil, la disminución de temperatura es bastante regular. A diferencia del día 20, no se aprecia una inversión superior tan marcada cerca de 9 km. La estructura indica una columna más homogénea térmicamente, con un gradiente relativamente continuo

Nieves

Durante el mes de septiembre, se registra acumulación nival significativa en el país principalmente tras sistemas frontales entre el 11 y 19 de septiembre, por lo que el promedio de nieve caída en las rutas de nieve presenta un superávit del 63% respecto al promedio 1991-2020. Por su parte, el Equivalente en Agua de la Nieve (EAN) derivado de la altura del manto nival presenta un superávit del 57%. Destaca la acumulación nival en la región de Coquimbo con las rutas de Cerro Olivares y Quebrada Larga, con superávit de 446% y 257%, respectivamente. Del Maule al Biobío, si bien se ha registrado precipitación nival, las rutas aún se encuentran en condición de déficit leve respecto al promedio histórico, a excepción de la ruta Volcán Chillán con superávit de 60% respecto a valores históricos.

La situación nival del país es de excedencia respecto a lo acumulado a la fecha en septiembre de 2025.

Caudales

Durante septiembre de 2026, los caudales monitoreados por la Dirección General de Aguas (DGA) presentaron un comportamiento heterogéneo a lo largo del territorio nacional. En comparación con agosto, el 55% de las estaciones analizadas registró aumentos, los que se concentraron principalmente entre las regiones de Atacama y Valparaíso y en la zona austral. Por el contrario, entre las regiones del Libertador General Bernardo O'Higgins y Los Lagos predominaron los descensos.

El análisis desagregado por zona geográfica indica que, en la Región de Atacama, el caudal de la estación *río Huasco en El Maitén* aumentó un 22% respecto del mes anterior. Asimismo, en el área comprendida entre las regiones de Coquimbo y Valparaíso se registró un incremento promedio de 62%, destacando la estación *río Hurtado en San Agustín*, con un aumento de 127%, seguida por *río Choapa en Cuncumén*, con un alza de 109%. La única excepción en este tramo correspondió a la estación *río Sobrante en Piñadero* (Región de Valparaíso), cuyo caudal disminuyó un 13%.

En la zona centro, comprendida entre la Región Metropolitana y la Región del Maule, los caudales registraron una disminución promedio de 11%. Las mayores reducciones se observaron en la Región del Maule, donde las estaciones *río Claro en Rauquén* y *río Perquilauquén en San Manuel* descendieron un 65% y un 40%, respectivamente. En contraste, las estaciones *río Mapocho en Los Almendros* y *río Maipo en El Manzano*, ambas en la Región Metropolitana, presentaron aumentos de 24% y 22%, respectivamente, mientras que *río Maule en Armerillo* registró un alza de 5%.

Por otra parte, en el área comprendida entre las regiones de Ñuble y Los Lagos se observó una disminución promedio de 17%. Dentro de este tramo, destacaron las estaciones *río Negro en Chahuilco* (Región de Los Lagos) y *río Diguillín en San Lorenzo* (Región de Ñuble), con descensos de 41% y 38%, respectivamente. Únicamente las estaciones ubicadas en el río Biobío presentaron aumentos: *río Biobío en Llanquén* (13%) y *río Biobío en Rucalhue* (3%). En contraposición, la zona austral registró un incremento promedio de 80%, destacando la estación *río Cisnes ante junta río Moro*, cuyo caudal aumentó un 142% respecto del mes anterior.

Al comparar los caudales medios mensuales de septiembre de 2026 con los correspondientes al mismo mes de 2025, se constató que el 97% de las estaciones presentó aumentos, alcanzando un incremento promedio nacional de 178%. La mayor variación positiva se registró en la estación *río Huasco en El Maitén* (Región de Atacama), con un aumento de 1.138%, seguida por las estaciones *río Alicahue en Colliguay* y *río Sobrante en Piñadero*, ambas en la Región de Valparaíso, con incrementos de 810% y 616%, respectivamente.

No obstante, en la zona austral las variaciones fueron más moderadas, con un incremento promedio de 44%. En esta zona se registró la única variación negativa del país, correspondiente a la estación *río Paine en Parque Nacional 2* (Región de Magallanes), cuyo caudal descendió un 28% en comparación con septiembre de 2025.

El análisis de los caudales respecto del promedio histórico correspondiente al período 1991-2020 indica que el 72% de las estaciones registró caudales superiores a sus respectivos promedios históricos. Esta condición se concentró en el área comprendida entre las regiones de Atacama y Los Lagos, donde se observó un incremento promedio de 72% respecto de dichos valores de referencia.

La mayor variación positiva se registró en la estación *río Huasco en El Maitén*, ubicada en la Región de Atacama, cuyo caudal fue un 465% superior a su promedio histórico. A continuación, se situaron las estaciones *río Sobrante en Piñadero* (Región de Valparaíso) y *río Hurtado en San Agustín* (Región de Coquimbo), con incrementos de 197% y 185%, respectivamente. En contraste, las estaciones de la Región Metropolitana presentaron caudales inferiores a sus promedios, con un déficit promedio de 19%, destacando *estero Arrayán en La Montosa*, con una disminución de 29%. Asimismo, la estación *río Claro en Rauquén* (Región del Maule) registró un déficit de 10%. Por su parte, la totalidad de las estaciones de la zona austral presentó déficits significativos, con una disminución promedio de 40%, siendo *río Cisnes ante junta río Moro* (Región de Aysén) la que registró la mayor reducción, con un 53%.

Finalmente, la comparación de los caudales observados con los mínimos históricos correspondientes a septiembre permitió establecer que la totalidad de los cauces monitoreados por la DGA presentó valores superiores a dichos registros. La estación que se mantuvo más próxima a su mínimo histórico fue *río Cisnes ante junta río Moro* (Región de Aysén), con un caudal 14% superior al mínimo registrado para dicho mes.

Embalses

Durante septiembre de 2026, los embalses monitoreados a nivel nacional mantuvieron una recuperación significativa de sus volúmenes almacenados, con un incremento de 19,4% respecto de agosto. Por tipo de uso, los embalses de “Solo Riego”, “Solo Generación”, “Generación y Riego” y “Agua Potable” aumentaron 27,4%, 20,7%, 14,2% y 3,6%, respectivamente, en relación con el mes anterior.

Al 30 de septiembre de 2026, el volumen total almacenado alcanzó 6.883 mill-m³, cifra 21,3% superior a la observada en igual período de 2025. El aumento interanual se concentró en los embalses de “Solo Generación”, con una variación de 52,2%, y “Solo Riego”, con 45,8%. En contraste, los embalses de “Generación y Riego” y de “Agua Potable” registraron disminuciones de 14,3% y 15,8%, respectivamente.

Respecto del promedio histórico 1991-2020, el almacenamiento nacional se ubicó 2,1% por sobre el valor de referencia para septiembre. Los embalses de “Solo Generación” presentaron la condición más favorable, con volúmenes 27,1% superiores al promedio histórico. Por el contrario, “Generación y Riego” registró el mayor déficit, con 18,7%, seguido por “Solo Riego”, con 6,4%, y “Agua Potable”, con 4,9%.

En conjunto, los embalses almacenaron un volumen equivalente al 53,4% de su capacidad total. Los destinados a “Solo Generación” alcanzaron el mayor nivel de llenado, con 94,7%, seguidos por “Solo Riego”, con 66,4%, y “Agua Potable”, con 55,6%. Los embalses de “Generación y Riego” registraron 28,5% de su capacidad, manteniéndose como el grupo con menor proporción de almacenamiento.

A escala individual, Santa Juana en la Región de Atacama; Recoleta, Cogotí, Corrales, el Bato y Culimo de la Región de Coquimbo y Bullileo de la Región del Maule alcanzaron o se situaron en torno a su capacidad máxima. También presentaron niveles cercanos al máximo Pangué, Ralco, Colbún, El Bato y Aromos. No obstante, persisten condiciones deficitarias en embalses relevantes, especialmente en los grupos de “Generación y Riego” y “Agua Potable”, por lo que resulta necesario mantener el seguimiento de su evolución durante la temporada de deshielo.

A continuación, se presenta el cuadro resumen de las variaciones de los volúmenes almacenados al cierre de septiembre de 2026, clasificadas según el uso principal de los embalses. Los valores negativos representan disminuciones o déficits respecto de la referencia indicada.

VARIACIÓN DE LOS VOLÚMENES DE EMBALSES PARA SEPTIEMBRE-2026

Tipo de Embalses	Volumen Actual Mill-m ³	Porcentaje respecto del Promedio *	Porcentaje Almacenado de su máxima capacidad	Variación Porcentual respecto a:	
				Mes Anterior	Año Pasado
Solo Riego	1.398	-6,4%	66,4%	27,4%	45,8%
Generación y Riego	1.980	-18,7%	28,5%	14,2%	-14,3%
Solo Generación	3.310	27,1%	94,7%	20,7%	52,2%
Agua Potable	195	-4,9%	55,6%	3,6%	-15,8%
Total	6.883	2,1%	53,4%	19,4%	21,3%

(*) Promedio correspondiente al período 1991 – 2020

Aguas Subterráneas.

En la región de Arica y Parinacota, durante septiembre de 2026, el acuífero Quebrada La Concordia, sector La Concordia, registró 6 centímetros de profundización en el nivel de agua subterráneas. En contraste, el acuífero Río Lluta, sector Lluta Bajo, presenta un ascenso de 128 centímetros.

Durante el mismo período, en la región de Tarapacá, el acuífero Pampa del Tamarugal muestra variaciones de 1 y 4 centímetros de descenso en Pozo Almonte y Salar Bellavista.

En la región de Antofagasta, el acuífero Río Loa, dentro del sector Calama, experimentó variaciones de ascenso de 1 y 6 centímetros en Salar de Brinkerhoff y en Vegas de Turi, respectivamente.

En la región de Atacama, el acuífero Río Copiapó, sector Piedra Colgada/Angostura presenta 8 centímetros de recuperación respecto a junio. El acuífero Río Huasco, sector Freirina, evidencia 23 centímetros de recuperación respecto a mayo, donde se realizó la última medición.

En la región de Coquimbo, el acuífero Río Los Choros, sector Los Choros Altos, tiene una profundización de 67 centímetros, respecto al mes de agosto. En el acuífero Río Elqui, sector Elqui Alto, el nivel continúa la tendencia al ascenso, registrando 157 centímetros de recuperación. El acuífero Quebrada Pan de Azúcar, sector Culebrón, registra 155 centímetros de descenso. En el acuífero Río Limarí, sector Río Rapel, el nivel de agua subterránea descendió 22 centímetros respecto al mes de agosto. Un comportamiento similar tuvo los sectores Punitaqui y Río Limarí, donde la baja alcanzó 19 y 7 centímetros, respectivamente. Finalmente, en el río Choapa, sector Choapa Medio, anotó una profundización de 46 centímetros.

Para la región de Valparaíso, en el acuífero Río La Ligua, sector Río La Ligua Costa, el nivel freático descendió 145 centímetros. Por otro lado, el acuífero Río Aconcagua, sector Nogales /Hijuelas, registra una recuperación de 13 centímetros respecto al mes de agosto, mientras que en el sector Aconcagua Desembocadura, el aumento fue de 2 centímetros.

En la región Metropolitana, el acuífero Río Maipo, sector Chacabuco Polpaico, mantiene la tendencia a la recuperación, registrando 64 centímetros de ascenso respecto al mes de agosto.

En la región de O'Higgins, el acuífero Río Rapel, sector Doñihue/Coinco/Coltauco, registra una leve recarga entre agosto y septiembre de 2026, alcanzando 3 centímetros de recuperación. En contraste, el nivel de agua subterránea del sector Tinguiririca Superior, se profundizó 93 centímetros.

En la región del Maule, el acuífero Río Mataquito, sector Teno Lontué, presenta un descenso de 21 centímetros. Similar comportamiento presentó el acuífero Río Maule, sector Maule Medio Sur, donde el nivel descendió 17 centímetros, respecto a agosto.

En la región de Ñuble, el acuífero Río Itata, sector Ñuble, reportó un incremento de 7 centímetros, entre los meses de agosto y septiembre de 2026.

En la región del Biobío, el acuífero Río Biobío registra 13 centímetros de descenso en Biobío Medio, respecto a agosto, y 65 centímetros de recuperación en el sector Tavoleo, respecto al mes de julio.

En la región de La Araucanía, el acuífero Río Imperial, sector Ríos Colpi Quillén, registra una pérdida de 9 centímetros, mientras que el acuífero Río Toltén, sector Toltén Alto, muestra un repunte de 52 centímetros.

En la región de Los Ríos, el acuífero Río Valdivia, sector Río Cruces, experimentó una baja de 6 centímetros en el nivel freático. Similar comportamiento se observa en el acuífero Río Bueno, sector Bueno Medio, donde el descenso fue de 13 centímetros.

En la región de Los Lagos, el nivel de agua subterránea del sector Rahue, acuífero Río Bueno, subió 71 centímetros. Por último, el acuífero Costeras Norte X, sector Maullín, mantiene la tendencia al ascenso, registrando una subida de 20 centímetros.

II. RESUMEN DE TABLAS Y GRÁFICOS, POR VARIABLE, ASOCIADAS A LAS ESTACIONES MÁS REPRESENTATIVAS CONTROLADAS

2.1.- PLUVIOMETRÍA

Tabla 2.-Totales al 30 de septiembre de 2026³

Estaciones	Mes Septiembre	Acumulada a la fecha 2026 (mm)	Acumulada a la fecha 2025 (mm)	Superávit o Déficit (%)	Promedio 1991-2020
ARICA	0	2.6	1.4	85.7	6.5
AZAPA	0	7.2	1.6	100.0	0.3
CENTRAL CHAPIQUIÑA	4.4	182.3	146.9	24.2	305.8
IQUIQUE	0	44.8	2.1	100.0	0.1
CONCHI EMBALSE	8.7	45.2	20.9	100.0	18.1
CALAMA	3.5	15.2	3.7	100.0	22.9
ANTOFAGASTA	0	10.1	4.6	100.0	0.1
LAS VEGAS	0.1	88.2	31.3	100.0	6.3
COPIAPO	0	34.2	18.4	85.9	3.9
LAUTARO EMBALSE	0.5	162.5	38.5	100.0	9.2
VALLENAR	0.7	200.3	38.8	100.0	56.4
SAN FELIX	0.1	326.0	55.3	100.0	65.1
RIVADAVIA	4.9	227.2	88.1	100.0	46
VICUÑA	3.2	198.3	88	100.0	27.6
LA SERENA	0.8	178.6	87.5	100.0	122.3
OVALLE	0.7	253.6	99.8	100.0	104.1
ILLAPEL	0.3	242.6	153.9	57.6	120.5
PALOMA EMBALSE	0.4	281.1	123.1	100.0	36.6
RECOLETA EMBALSE	0	246.6	102.4	100.0	75.2
COGOTI 18	3	347.5	154.4	100.0	113.2
HUINTIL	0.2	387.7	187	100.0	168.3
LOS VILOS	0	258	198.7	29.8	234.8
LA MOSTAZA	1.5	172.9	251.2	-31.2	136.6
VILCUYA	4.8	294	303.7	-3.2	150.2
SAN FELIPE	1.4	308.3	183.7	67.8	181
QUILLOTA	0.4	290.2	274.8	5.6	227.2
LOS AROMOS	2.9	408.7	349.7	16.9	273.4
LAGO PEÑUELAS	5.4	348.7	575.3	-39.4	285.4
RODELILLO	1.8	362	402.6	-10.1	285.8
RUNGUE EMBALSE	1.7	343.6	303.4	13.2	160.6
EL YESO EMBALSE	57.4	577.5	538.5	7.3	299.7
LAGUNA ACULEO	1	238.1	468.2	-49.1	128.5
SAN GABRIEL	20	516.8	486.4	6.3	303.2
SAN JOSE DE MAIPO RETEN	17.9	482	419.5	14.9	343.2
CERRO CALAN	6.5	307.2	339.1	-9.4	282.3
QUEBRADA SAN RAMON	4.9	328.6	s/Normal	s/n	300
QUEBRADA DE MACUL	3	294	s/Normal	s/n	171
SANTIAGO (MOP)	1.4	217.4	273	-20.4	204.8
MELIPILLA	0	328.2	336.2	-2.4	245.8
RANCAGUA	5.9	311.6	350.9	-11.2	264.5

³ Superávit mayor al 100% puede ser un valor mayor, pero se limita a 100%.

Estaciones	Mes Septiembre	Acumulada a la fecha 2026 (mm)	Acumulada a la fecha 2025 (mm)	Promedio 1991-2020 (mm)	Superávit o Déficit (%)
SAN FERNANDO	48	507.75	584.7	-13.2	399
LA RUFINA	29.9	710.6	898.6	-20.9	275.3
CONVENTO VIEJO	8.3	411	562.4	-26.9	410.5
PICHILEMU	5.7	383.4	422.9	-9.3	306.8
CURICO	14.3	490	547.2	-10.5	446.4
TALCA UC	18.3	496.9	527	-5.7	327.9
COLORADO	49.1	993.5	1153.4	-13.9	771.7
LINARES	45.8	708.8	727.9	-2.6	486.9
PARRAL	81	1085.5	789.9	37.4	676.3
DIGUA EMBALSE	103.5	1260.25	1188.7	6.0	830.1
CONSTITUCION	52.3	842.8	671	25.6	624.6
CHILLAN	124.8	992.6	878.7	13.0	654
EMBALSE COIHUECO	139.2	1282.9	1238.1	3.6	821.2
CONCEPCION	142.4	920.2	986.4	-6.7	640.6
LOS ANGELES	110.2	942	926.2	1.7	645.9
CAÑETE	152.4	972.6	1074.5	-9.5	718
MULCHEN	145.2	1229.6	1064.5	15.5	1398.8
ANGOL	161.1	1253	962.7	30.2	824.9
MALALCAHUELLO	367.7	2084.601	1679.9	24.1	1265.402
LONQUIMAY	333.8	1687.47	1214.3	39.0	945.8
TEMUCO	205.8	1251.7	979.5	27.8	848.8
PUCON	275.4	1953.8	1746.9	11.8	1632.5
VALDIVIA	269.7	2099.5	1659.6	26.5	1553.3
OSORNO	119.2	1037.7	1035.7	0.2	900.1
PUERTO MONTT	147.6	1254.8	1503.2	-16.5	1310.4
LAGO CHAPO	315	2136.6	2417.2	-11.6	1829.8
PUELO	343.2	2438.3	2326.3	4.8	2391.8
CHAITÉN	285.9	2227.4	2646.3	-15.8	2690.5
HORNOPIREN	522	3727	2880.1	29.4	3661.6
ANCUD	155.1	1665.498	1744.2	-4.5	2068.6
CASTRO	134.6	1208.1	s/Normal	s/n	1129.4
LA JUNTA	239.8	1678.7	1786.8	-6.0	2166
COYHAIQUE	53.3	492.2	732.7	-32.8	606.8
TORRES DEL PAINE	25.2	486.4	569.7	-14.6	415.1
PUNTA ARENAS	30.5	437.2	420.8	3.9	416.6
BAHIA SAN FELIPE	12.5	247.8	294.6	-15.9	172
RIO ROBALO EN PUERTO WILLIAMS	27.4	479.2	426.2	12.4	383.8

Promedios acumulados para el período 1991-2020 (D.G.A)

Valores expresados en milímetros (1 mm = 1 lt x m²)

FIGURA 2.1.1




FIGURA 2.1.2





FIGURA 2.1.3



4

⁴ Valores de exceso sobre el 100%




Figura 2.1.4. Cartas Sinópticas. En primera fila se muestran mapas de altura geopotencial a 500 hPa (Z500) en contorno y presión reducida a nivel del mar (PRMSL) en colores, segunda fila agua precipitable (pwat) y tercera fila componentes meridional y zonal del viento (u y v) como vectores y temperatura en superficie (Temp) en colores. Cada columna representa una hora de muestra de un día asociado a un evento de precipitaciones ocurrido durante septiembre 2026. Datos obtenidos desde Saha, S., et al. 2011

Isoterma Cero




Figura 2.1.5. Altura de isoterma cero elaboradas en base a los radiosondeos lanzados en las ciudades de Santo Domingo (CIM0085586) y Puerto Montt (CIM00085799). La información fue obtenida desde el portal de IGRA2 de NOAA.⁶

Bibliografía

Durre, I., & Vose, R. S. (2019). Integrated Global Radiosonde Archive.
 Guo, Y., Wang, G., & Chao, Q. (2022). Climatological analysis of freezing level height over China and its implications using homogenized in-situ data. *International Journal of Climatology*, 42(1), 559–576. <https://doi.org/10.1002/joc.7260>
 Saha, S., et al. (2011). NCEP Climate Forecast System Version 2 (CFSv2) Selected Hourly Time-Series Products (Updated monthly) [Dataset]. Research Data Archive at the National Center for Atmospheric Research, Computational and Information Systems Laboratory

2.2.- NIEVES

Tabla 2.2.1

Valores aproximados al 30-septiembre 8 hrs

Altura de nieve (cm)							
Región	Cuenca	Ruta	Elevación	Altura de nieve 2026	Promedio 1991-2020	Déficit o superávit	Altura de nieve 2025*
			(m s.n.m.)	(cm)	(cm)	%	(cm)
Coquimbo	Elqui	Cerro Olivares	3566	102	19	446	0
	Limarí	Quebrada Larga	3550	151	42	257	0
	Limarí	Cerro Vega Negra	3529	263	94	179	72
	Choapa	El Soldado	3293	117	95	24	0
Valparaíso	Petorca	Nacimiento del Sobrante	3143	164	91	81	28
	Aconcagua	Portillo	3032	230	112	106	0
Metropolitana	Maipo	Laguna Negra	2785	128	127	1	0
Maule	Maule	Lo Aguirre ¹	1989	157	177	-11	52
Ñuble	Itata	Volcán Chillán	2078	189	118	60	74
Biobío	Biobío	Alto Mallines	1784	122	119	2	0
Promedio				162	99	63	23

(*) Valor de temporada misma fecha ¹: Nueva Lo Aguirre

(S/I) Sin información

Figura 2.2.1.




Tabla 2.2.2

Valores aproximados al 30-septiembre 8 hrs

Equivalente en agua de la nieve "EAN" (mm)							
Región	Cuenca	Ruta	Elevación	EAN 2026	Promedio 1991-2020	Déficit o superávit	EAN 2025*
			(m s.n.m.)	(mm)	(mm)	%	(mm)
Coquimbo	Elqui	Cerro Olivares ³	3566	381	66	477	0
	Limarí	Quebrada Larga ³	3550	566	154	267	0
	Limarí	Cerro Vega Negra ³	3529	984	381	158	240
	Choapa	El Soldado ³	3293	439	298	47	0
Valparaíso	Petorca	Nacimiento del Sobrante ²³	3143	615	295	108	105
	Aconcagua	Portillo ³	3032	863	450	92	0
Metropolitana	Maipo	Laguna Negra	2785	649	477	36	0
Maule	Maule	Lo Aguirre ¹²	1989	481	720	-33	193
Ñuble	Itata	Volcán Chillán ²³	2078	709	535	32	278
Biobío	Biobío	Alto Mallines	1784	440	524	-16	0
Promedio				613	390	57	82


(*) Valor de temporada misma fecha ¹: Nueva Lo Aguirre

²: EAN 2025 estimado con densidad de 375 kg/m³


(S/I) Sin información

³: EAN 2026 estimado con densidad de 375 kg/m³


Figura 2.2.2.



Precipitaciones acumuladas a Septiembre de 2026, en comparación con el promedio histórico para el mismo mes entre los años 1991-2020




Río Copiapó en Pastillo



	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Q.2025-2026	0.5	0.5	0.9	1.5	1.3	0.8	1.4	0.8	0.9	1.2	1.6	5.4
Q.2024-2025	3.0	1.6	1.9	2.2	3.9	2.3	1.4	1.3	1.2	1.0	1.0	(*)
Q.Promedio*	1.5	1.6	2.2	3.1	2.6	2.1	2.0	2.1	2.3	2.1	1.9	1.7
Q.Min.Mes*	0.6	0.3	0.3	0.7	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8

(*) Limpieza de cauce


Río Huasco en El Maitén



	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Q.2025-2026	1.2	0.7	0.4	0.4	0.6	(*)	0.8	1.5	1.3	8.4	19.3	23.5
Q.2024-2025	1.1	1.5	2.2	2.9	3.3	2.9	2.7	2.9	2.9	2.6	3.4	1.9
Q.Promedio*	4.8	6.6	7.9	7.2	5.5	4.6	5.3	5.6	5.9	5.3	4.9	4.2
Q.Min.Mes*	2.3	1.3	1.3	0.7	0.4	0.2	0.5	0.6	0.9	1.4	1.9	2.4


(*) Limpieza de cauce

Río Elqui en Algarrobal




	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Q.2025-2026	2.5	2.2	1.9	2.0	1.8	1.6	1.6	1.6	1.6	6.4	9.6	18.8
Q.2024-2025	2.7	3.0	2.6	3.3	3.3	3.1	3.7	2.9	2.6	2.6	3.2	3.6
Q.Promedio*	8.4	11.3	14.2	13.7	10.2	7.9	7.1	6.9	7.0	6.9	7.0	7.4
Q.Min.Mes*	1.8	2.0	1.9	2.1	2.1	2.6	2.6	2.6	2.7	3.1	2.9	2.4

Río Hurtado en San Agustín




	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Q.2025-2026	1.1	0.8	0.7	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.7	2.6	6.0
Q.2024-2025	1.8	2.0	1.6	1.4	1.3	1.2	1.5	1.1	1.0	1.0	1.2	1.6
Q.Promedio*	2.5	3.3	4.0	3.3	2.3	1.9	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	2.1
Q.Mín.Mes*	0.7	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8

Río Grande en Las Ramadas




	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Q.2025-2026	2.5	1.7	1.1	0.8	0.7	0.7	0.6	0.9	1.0	1.9	4.0	7.4
Q.2024-2025	4.7	3.7	2.3	1.5	1.0	0.9	0.8	0.9	0.9	1.0	1.7	2.3
Q.Promedio*	5.9	7.5	5.0	2.8	1.9	1.6	1.6	1.8	2.2	2.3	2.6	3.8
Q.Mín.Mes*	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9

Río Choapa en Cuncumén




	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Q.2025-2026	5.1	3.8	2.8	1.8	1.8	1.8	1.4	1.3	1.2	2.1	4.5	9.3
Q.2024-2025	20.9	20.8	9.0	5.1	3.3	3.1	2.7	2.3	2.3	2.2	2.5	3.4
Q.Promedio*	13.3	20.2	15.4	8.6	5.2	3.8	3.6	3.6	4.0	4.1	5.0	7.1
Q.Mín.Mes*	1.2	1.1	0.9	0.9	0.9	0.8	1.0	0.9	1.1	1.3	1.4	1.4

Río Sobrante en Piñadero




	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Q.2025-2026	0.53	0.36	0.25	0.09	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	1.11	4.22	3.65
Q.2024-2025	3.30	1.48	0.58	0.37	0.27	0.23	0.23	0.23	0.26	0.25	0.46	0.51
Q.Promedio*	1.43	1.56	0.93	0.47	0.36	0.33	0.31	0.39	0.59	0.68	1.16	1.23
Q.Min.Mes*	0.08	0.06	0.03	0.06	0.05	0.03	0.03	0.03	0.06	0.11	0.10	0.09

Río Alicahue en Colliguay




	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Q.2025-2026	0.36	0.24	0.24	0.17	0.21	0.18	0.20	0.11	0.13	0.89	2.79	2.91
Q.2024-2025	1.86	1.33	0.66	0.39	0.28	0.24	0.17	0.17	0.19	0.19	0.27	0.32
Q.Promedio*	1.72	1.72	1.16	0.74	0.63	0.49	0.42	0.45	0.72	0.76	1.08	1.39
Q.Min.Mes*	0.16	0.15	0.06	0.03	0.04	0.01	0.03	0.08	0.11	0.11	0.12	0.15

Río Aconcagua en Chacabucito




	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Q.2025-2026	20.3	29.0	25.4	23.0	15.8	11.9	8.9	7.1	6.0	10.2	20.1	25.7
Q.2024-2025	37.4	64.3	51.3	37.7	28.2	16.6	10.7	9.4	9.1	9.2	10.5	12.7
Q.Promedio*	28.2	51.0	64.2	50.9	32.0	20.3	13.5	12.1	13.4	13.2	14.1	18.3
Q.Min.Mes*	6.1	12.1	14.5	17.3	15.4	12.1	7.3	4.9	4.7	5.5	5.1	5.5

Estero Arrayán en la Montosa




	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Q.2025-2026	0.9	0.8	0.5	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	1.1	0.9
Q.2024-2025	2.2	2.5	1.5	1.0	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7
Q.Promedio*	1.7	2.5	2.1	1.2	0.9	0.7	0.7	0.9	1.1	1.0	1.1	1.2
Q.Min.Mes*	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4

Río Mapocho en Los Almendros




	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Q.2025-2026	5.2	4.2	3.2	3.1	2.4	1.7	1.4	1.4	1.0	1.9	4.4	5.5
Q.2024-2025	10.1	8.5	6.0	4.0	3.1	2.1	1.5	1.7	1.9	1.8	3.1	4.5
Q.Promedio*	8.1	8.9	7.6	5.3	3.4	2.3	2.0	2.8	3.8	4.0	5.0	6.7
Q.Min.Mes*	1.2	1.4	1.7	2.3	1.4	1.1	0.8	0.7	0.6	0.7	0.8	0.8

Río Maipo en El Manzano




	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Q.2025-2026	73.4	100.7	104.7	95.6	74.9	57.6	41.7	33.1	25.5	34.1	51.8	63.0
Q.2024-2025	115.7	166.8	169.6	144.0	114.5	82.3	60.7	51.5	44.1	39.1	42.0	50.0
Q.Promedio*	93.8	144.5	188.5	182.5	134.7	94.4	69.9	66.7	60.2	58.9	60.2	69.4
Q.Min.Mes*	39.3	51.9	58.7	77.6	63.8	47.6	26.2	23.0	24.1	27.4	31.2	38.2

Río Cachapoal en Puente Termas (Reg.Nat.)




	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Q.2025-2026	75.8	89.2	101.9	158.6	119.4	85.7	61.4	50.3	21.8	56.6	66.6	61.4
Q.2024-2025	101.4	146.0	167.0	138.7	91.4	53.3	25.2	38.2	27.6	22.9	41.1	42.8
Q.Promedio*	61.2	114.1	140.7	129.8	95.8	61.8	42.5	38.4	34.5	38.9	41.1	45.8
Q.Min.Mes*	22.4	45.4	52.4	65.9	54.6	44.2	25.7	17.8	16.4	16.0	15.7	18.3

Río Tinguiririca bajo Los Briones




	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Q.2025-2026	35.0	48.0	46.4	38.7	26.8	19.2	14.3	9.5	7.3	35.2	45.5	43.7
Q.2024-2025	64.2	79.7	78.2	63.3	39.9	26.0	20.5	16.3	14.9	13.8	19.8	24.2
Q.Promedio*	45.7	70.8	89.5	87.6	57.5	35.2	24.6	24.2	33.6	30.3	34.3	36.3
Q.Min.Mes*	13.8	29.3	31.6	37.3	29.5	21.4	10.0	6.3	9.6	10.5	11.0	12.1

Río Teno despues de Junta con Claro



	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Q.2025-2026	46.2	41.4	22.4	19.1	16.3	17.4	20.5	17.8	11.1	79.0	90.4	75.9
Q.2024-2025	96.4	82.2	60.2	34.7	24.0	15.6	13.9	17.4	14.1	12.9	26.0	34.7
Q.Promedio*	64.8	87.0	79.2	52.5	36.1	23.8	20.4	32.9	55.2	52.6	55.4	56.5
Q.Min.Mes*	23.5	26.4	17.2	14.9	10.1	8.3	6.6	5.2	13.2	14.5	16.4	19.4


Río Claro en Rauquén



	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Q.2025-2026	77.0	49.5	32.6	(*)	23.8	49.8	44.3	42.4	47.4	250.0	258.0	90.5
Q.2024-2025	94.1	63.9	42.5	26.0	28.4	34.3	44.1	54.2	96.0	57.7	108.7	74.8
Q.Promedio*	81.1	68.6	51.2	32.4	29.5	33.2	43.1	73.6	149.7	154.5	130.5	101.1
Q.Min.Mes*	32.6	38.0	24.5	16.6	15.5	16.9	20.1	30.2	44.3	42.8	45.7	36.3

(*) Falla de sensor


Río Maule en Armerillo (Reg.Nat.)



	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Q.2025-2026	232.2	215.6	154.8	108.8	104.3	109.0	107.8	103.4	101.9	446.0	408.2	430.0
Q.2024-2025	554.7	457.7	253.0	161.0	(*)	89.2	87.4	121.0	130.4	125.2	179.4	199.8
Q.Promedio*	310.2	363.7	264.2	159.6	115.3	92.7	90.5	136.3	191.1	209.5	233.0	233.9
Q.Min.Mes*	174.9	162.7	102.1	72.3	61.4	53.2	54.1	55.3	79.0	109.3	112.0	145.0


(*) Cauce desviado por obras de mantención

Río Perquilauquén en San Manuel




	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Q.2025-2026	22.8	7.7	3.4	2.2	2.1	8.8	4.5	9.3	6.8	89.0	96.1	58.0
Q.2024-2025	29.7	11.8	6.0	3.1	2.2	2.2	3.2	14.5	24.2	19.6	40.2	31.5
Q.Promedio*	32.5	19.4	10.1	4.5	3.2	3.6	8.9	33.8	71.9	62.7	52.9	45.0
Q.Min.Mes*	6.3	4.1	3.2	1.5	1.2	1.0	1.5	1.8	8.5	13.5	13.1	11.1

Río Diguillín en San Lorenzo (Atacalco)




	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Q.2025-2026	13.1	6.5	3.7	2.3	2.1	5.5	3.8	7.9	6.4	54.7	49.9	30.9
Q.2024-2025	23.4	14.0	8.3	4.5	3.3	2.6	3.0	9.0	12.9	11.5	18.2	17.0
Q.Promedio*	17.3	12.2	7.9	4.8	3.7	3.2	4.9	17.1	32.2	28.2	25.2	21.0
Q.Min.Mes*	5.2	3.3	2.5	1.9	1.4	1.5	1.2	1.7	5.4	6.6	9.9	8.8

Río Ñuble en San Fabián




	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Q.2025-2026	109.1	68.1	29.9	16.3	14.9	29.8	20.2	28.9	27.6	241.3	250.2	201.4
Q.2024-2025	203.5	148.9	74.4	34.6	19.2	14.9	15.7	37.4	52.2	51.1	119.7	101.6
Q.Promedio*	142.2	130.0	84.8	43.9	27.8	21.5	27.8	83.2	146.8	138.1	130.3	135.1
Q.Min.Mes*	47.0	27.7	26.9	18.0	14.1	10.2	8.9	12.5	26.0	51.5	40.6	46.1

Río Biobío en Llanquén



	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Q.2025-2026	120.2	77.0	47.1	31.5	26.3	38.4	33.2	58.8	52.2	204.2	295.7	335.3
Q.2024-2025	379.1	246.8	105.3	49.0	29.6	23.3	31.2	52.6	49.7	60.2	136.0	138.6
Q.Promedio*	239.6	214.0	106.9	54.4	35.6	28.7	34.1	58.2	146.1	187.6	178.7	205.3
Q.Min.Mes*	96.0	63.7	50.8	31.8	22.9	19.5	19.7	27.0	23.3	46.1	67.2	105.2


Río Biobío en Rucalhue



	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Q.2025-2026	357.7	(*)	65.0	83.9	132.0	168.4	149.6	226.7	253.9	660.8	913.4	941.1
Q.2024-2025	668.5	535.8	292.9	151.3	144.1	135.8	156.8	248.2	222.5	239.3	484.9	398.9
Q.Promedio*	568.4	478.8	325.0	186.8	139.8	124.6	148.2	299.0	587.1	643.6	559.4	560.4
Q.Min.Mes*	208.1	130.8	87.1	84.0	68.6	70.8	61.9	87.3	92.1	192.5	214.0	211.5


(*) Problemas en la configuración de equipos (Trama de datos)

Río Cautín en Cajón




	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Q.2025-2026	135.6	81.3	55.2	37.7	35.3	67.2	55.8	113.3	106.3	230.6	279.8	219.7
Q.2024-2025	190.0	124.7	84.4	49.4	29.3	29.3	40.5	66.0	90.0	117.6	181.3	179.9
Q.Promedio*	149.6	113.1	82.4	47.3	38.5	34.1	47.9	106.9	239.1	262.9	224.4	196.3
Q.Min.Mes*	54.7	30.8	23.4	19.3	17.3	17.1	16.1	32.8	36.3	82.3	109.7	84.7

Río Cruces en Rucaco




	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Q.2025-2026	65.4	31.6	20.5	11.0	10.2	24.5	19.8	37.6	52.0	214.3	281.5	217.6
Q.2024-2025	89.2	52.9	32.7	13.6	8.4	11.2	24.9	50.4	83.2	75.8	129.0	102.6
Q.Promedio*	80.5	55.1	37.7	21.1	14.5	14.1	21.7	60.4	165.9	190.5	162.5	121.57
Q.Min.Mes*	30.7	17.5	11.9	8.7	7.1	7.2	8.3	16.5	18.5	55.0	89.1	56.9

Río Pilmaiquén en San Pablo




	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Q.2025-2026	166.3	118.2	89.5	72.2	62.2	98.4	112.9	156.9	127.1	274.5	317.4	278.8
Q.2024-2025	151.6	153.0	122.5	76.2	58.2	75.5	102.4	183.5	208.9	152.3	208.0	180.1
Q.Promedio*	176.3	157.9	138.7	108.2	84.4	82.1	101.1	153.5	257.7	275.0	253.9	213.1
Q.Mín.Mes*	87.3	64.8	51.3	44.9	43.8	36.9	41.2	56.3	50.4	84.2	182.9	121.7

Río Negro en Chahuilco




	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Q.2025-2026	76.7	21.4	10.5	6.3	6.1	22.7	19.3	45.5	51.2	186.2	198.8	117.9
Q.2024-2025	44.8	26.9	12.6	6.6	6.3	9.0	12.9	60.1	95.9	81.9	158.6	79.0
Q.Promedio*	56.7	34.3	18.7	11.3	9.3	10.4	20.2	57.7	134.7	148.6	139.0	92.1
Q.Mín.Mes*	24.7	14.4	8.6	4.1	3.0	3.9	4.6	8.7	9.2	21.7	74.3	43.7

Río Cisnes ante junta Río Moro




	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Q.2025-2026	47.1	10.8	4.7	4.1	3.7	8.2	8.1	7.1	6.1	7.0	11.4	27.5
Q.2024-2025	30.8	38.6	10.6	4.2	3.8	5.7	4.2	12.8	11.4	25.3	21.7	16.6
Q.Promedio*	72.4	67.1	39.4	22.4	13.0	13.1	20.1	33.6	45.2	49.6	56.3	58.9
Q.Mín.Mes*	32.5	28.9	13.1	7.3	4.8	3.6	3.6	4.8	4.8	5.8	18.7	24.1

Río Aysén en Puerto Aysén




	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Q.2025-2026	816.0	377.9	297.8	240.2	221.7	466.7	501.2	327.3	230.0	192.4	243.2	397.9
Q.2024-2025	415.0	605.0	351.5	253.0	320.4	385.6	270.9	428.5	384.4	917.0	417.9	354.5
Q.Promedio*	607.5	644.7	567.0	499.0	369.0	405.7	446.3	559.2	596.8	534.6	563.5	497.4
Q.Mín.Mes*	279.5	416.6	328.1	250.9	186.7	154.8	158.9	111.8	79.1	161.6	229.9	270.3

Río Paine en Parque Nacional 2



	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Q.2025-2026	35.4	58.5	73.2	98.0	94.4	56.6	72.8	33.9	25.1	13.8	7.8	10.7
Q.2024-2025	53.3	62.3	61.9	94.5	83.9	65.6	36.2	25.9	21.3	20.5	10.4	14.9
Q.Promedio*	34.6	53.3	77.7	97.5	97.4	82.5	56.0	36.7	20.9	18.0	17.5	20.0
Q.Mín.Mes*	20.8	23.1	38.9	63.0	52.9	45.4	29.7	11.3	7.5	6.0	4.8	8.0


Río Las Minas en B.T. Sendos



	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Q.2025-2026	0.66	0.29	0.29	0.19	0.06	0.94	0.50	0.76	1.29	1.07	0.47	0.83
Q.2024-2025	2.07	1.46	1.18	0.79	0.14	0.29	0.15	0.82	0.57	0.33	0.57	0.37
Q.Promedio*	1.75	0.57	0.35	0.28	0.26	0.49	0.93	0.95	1.40	1.30	1.02	1.40
Q.Mín.Mes*	0.42	0.13	0.08	0.04	0.04	0.12	0.14	0.13	0.16	0.18	0.21	0.41

* Caudales Promedio y Mínimos Mensuales del período 1991 - 2020

Mapa de Variación de Caudales para el mes de septiembre de 2026 con respecto al promedio histórico del mismo mes en el período 1991-2020.



2.3 EMBALSES

Tabla 3
Volúmenes Almacenados
Al 30 de septiembre de 2026
(mill-m³)

EMBALSE	REGIÓN CUENCA	CAPACIDAD	PROMEDIO HISTÓRICO MENSUAL	VOL. ACTUAL VS CAPACIDAD (%)	SEPTIEMBRE		
					2026	2025	USO PRINCIPAL
Conchi	Antofaga Loa	22	19	88%	19.5	21.0	Riego
Lautaro	Atacama Copiapó	26	11	56%	14.6	5.3	Riego
Santa Juana	Atacama Huasco	166	127	100%	166.0	118.9	Riego
La Laguna	Coquimb Elqui	38	31	33%	12.4	18.1	Riego
Puclaro	Coquimb Elqui	209	142	44%	91.6	46.5	Riego
Recoleta (+ +)	Coquimb Limarí	100	70	100%	100.0	22.2	Riego
La Paloma (+)	Coquimb Limarí	750	437	61%	457.8	82.9	Riego
Cogotí (+ + +)	Coquimb Limarí	137	74	100%	136.7	39.0	Riego
Culimo (*)	Coquimb Quilimarí	9	4	100%	9.2	5.2	Riego
El Bato	Coquimb Choapa	26	19	100%	25.5	25.7	Riego
Corrales	Coquimb Choapa	50	37	100%	50.0	47.2	Riego
Aromos	Valparaís Aconcagua	35	28	98%	34.5	35.5	Agua Potable
Peñuelas	Valparaís Peñuelas	95	21	17%	16.0	10.4	Agua Potable
El Yeso	Metropol Maipo	220	156	64%	141.3	185.3	Agua Potable
Convento Viejo	O´ Higgir Rapel	237	206	92%	217.0	214.2	Riego
Rapel	O´ Higgir Rapel	695	544	76%	527.1	550.8	Generación
Colbún	Maule Maule	1544	1178	97%	1497.7	1051.8	Generación
Lag. Maule (#)	Maule Maule	1359	662	52%	704.9	782.0	Generación y Riego
Bullileo	Maule Maule	60	56	100%	60.0	51.7	Riego
Digua	Maule Maule	225	218	99%	223.3	224.3	Riego
Tutuvén	Maule Maule	22	13	72%	15.7	8.4	Riego
Coihueco	Ñuble Itata	29	29	85%	24.6	28.5	Riego
Lago Laja	Biobío Biobío	5582	1775	27%	1520.3	1528.5	Generación y Riego
Ralco	Biobío Biobío	1174	806	98%	1154.8	493.6	Generación
Pangué	Biobío Biobío	83	76	100%	82.8	78.1	Generación

(+) Volumen del embalse Paloma en atención a la curva de almacenamiento del "Estudio Topobatimétrico y Análisis de Prolongación de la Vida útil del Embalse Paloma, Región de Coquimbo" desarrollado por la Dirección de Obras Hidráulicas el año 2016

(+ +) Capacidad máxima del embalse considerando peraltamiento de vertedero aprobado mediante Resolución DGA N°239, de 15 de febrero de 2021

(+ + +) Capacidad máxima del embalse considerando **sin** Rubber Dam operativa

(#) Volumen de Laguna del Maule en atención a la curva de almacenamiento del Estudio "Servicio levantamiento lidar, batimetría, topografía y radiofrecuencia embalse Laguna del Maule, Región del Maule", DOH 2022

(*) Capacidad del embalse según información proporcionada por la DOH del 18/07/26, modificando de 10 Hm3 a 9,172 Hm3.

Tabla 4
Resumen Anual

EMBALSE	2025-2026											
	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A
Conchi	21.0	20.5	19.7	19.1	19.0	17.9	17.5	17.5	18.1	18.7	19.2	19.7
Lautaro (*)	5.3	3.9	2.7	1.8	2.7	2.7	2.1	2.0	2.0	2.6	6.4	10.4
Santa Juana	118.9	117.2	113.5	108.0	102.3	93.7	88.2	85.5	85.5	86.5	106.2	131.9
La Laguna (**)	18.1	18.0	17.0	15.5	13.1	11.0	9.6	9.0	8.7	9.0	9.3	10.0
Puclaro (**)	46.5	45.3	42.1	38.2	33.9	30.2	27.0	25.1	23.8	24.3	44.3	68.6
Recoleta	22.2	21.2	20.5	19.1	16.5	14.1	12.0	10.1	9.0	9.9	100.0	100.0
La Paloma	82.9	86.1	81.9	71.5	60.4	50.0	40.8	35.5	34.4	35.7	212.3	334.3
Cogotí (**)	39.0	39.0	36.4	32.8	29.6	25.7	21.8	18.4	16.6	15.5	130.0	136.7
Culimo	5.2	5.2	5.2	4.8	4.7	4.3	4.0	3.8	3.7	3.5	9.2	9.2
El Bato	25.7	25.6	25.0	23.2	21.0	18.8	17.0	16.1	15.5	15.5	18.9	25.3
Corrales	47.2	50.2	49.2	45.3	40.5	37.5	31.3	27.6	25.7	25.1	50.0	50.0
Aromos	35.5	34.8	32.7	30.0	26.9	23.6	20.5	18.2	16.1	16.9	29.5	33.7
Peñuelas	10.4	9.8	9.1	8.4	7.6	7.0	6.3	5.9	5.6	5.5	14.2	16.5
El Yeso	185.3	185.9	187.2	196.8	204.4	194.7	177.3	157.9	147.1	142.7	144.2	144.4
Convento Viejo	214.2	207.9	199.1	169.9	122.7	87.8	93.0	117.2	154.1	153.6	194.1	215.3
Rapel	550.8	575.9	599.3	597.8	597.8	594.2	480.0	429.1	394.3	413.0	558.4	556.5
Colbún	1051.8	1226.9	1258.8	1164.7	1034.6	926.0	924.7	817.9	719.6	567.5	1155.9	1517.0
Lag. Maule	782.0	803.0	827.7	808.8	717.6	675.6	670.0	648.9	621.8	617.3	655.4	687.2
Bullileo	51.7	60.1	59.7	46.3	21.4	1.4	1.0	2.3	5.0	6.3	49.4	59.1
Digua	224.3	220.9	178.3	119.0	55.5	18.2	22.8	24.2	36.1	47.0	119.6	191.8
Tutuvén	8.4	8.8	7.5	5.5	3.6	1.9	1.0	0.9	1.0	1.2	7.7	13.3
Coihueco	28.5	29.6	28.5	23.0	15.6	9.1	9.6	11.3	15.8	19.3	20.9	22.4
Lago Laja (&)	1528.5	1605.5	1616.7	1482.6	1295.3	1134.8	1071.2	1043.3	974.3	875.0	1078.1	1293.1
Ralco	493.6	528.5	766.5	895.2	862.4	748.8	729.0	664.4	606.0	476.7	948.7	1153.8
Pangué	78.1	71.6	78.1	69.5	79.3	80.2	73.3	74.5	72.3	73.2	80.7	82.9


(*) : Curva corregida por embanque

(**): Se realiza ajuste de Capacidad Máxima.


(&) : Volumen sobre cota 1300 msnm

Embalse Conchi


Capacidad 22 mill-m3

**Embalse Lautaro**

Capacidad 26 mill-m3


**Embalse Santa Juana**

Capacidad 166 mill-m3




Embalse La Paloma


Capacidad 750 mill-m3

**Embalse El Yeso**

Capacidad 220 mill-m3


**Embalse Rapel**

Capacidad 695 mill-m3




Embalse Colbún


Capacidad 1544 mill-m3



**Laguna del Maule**

Capacidad 1359 mill-m3

**Lago Laja**

Capacidad 5582 mill-m3






Mapa de Proporción de Acumulación de Agua en Embalses de Chile en septiembre de 2026, respecto a sus capacidades totales.

*PH = % Volumen embalsado actual respecto del Volumen Promedio Histórico en el mes en curso




El tamaño de cada gráfico 'torta' está dimensionado referencialmente en función de la envergadura del embalse



2.4 Aguas Subterráneas

Niveles medidos en pozos

*Gráficos de últimos cinco años.




"POZO JICA 9"

Región Tarapacá

Acuífero Pampa del Tamarugal - Sector Pampa del Tamarugal en Pozo Almonte

UTM (WGS84) Norte: 7770096 m Este: 428241 m Altitud: 1093 m.s.n.m.




◆ Pozo con nivel estático

"POZO JICA D"

Región Tarapacá

Acuífero Pampa del Tamarugal - Sector Pampa del Tamarugal en Salar Bellavista

UTM (WGS84) Norte: 7705021 m Este: 438501 m Altitud: 1004 m.s.n.m.




◆ Pozo con nivel estático

"ISLA GRANDE"

Región Antofagasta




Acuífero Río Loa - Sector Calama en Salar Brinkerhoff

UTM (WGS84) Norte: 7522980 m Este: 534964 m Altitud: 2215 m.s.n.m.



◆ Pozo con nivel estático

Pozo sin datos jun22-oct22, oct23-dic23, feb24-jun24.




"HACIENDA MANFLAS"

Región Atacama

Acuífero Río Copiapó - Sector Aguas Arriba Embalse Lautaro

UTM (WGS84) Norte: 6886875 m Este: 403325 m Altitud: 1418 m.s.n.m.




◆ Pozo con nivel estático

"VILLA MARIA - HORNITOS"

Región Atacama

Acuífero Río Copiapó - Sector La Puerta - Mal Paso

UTM (WGS84) Norte: 6936456 m Este: 379570 m Altitud: 715 m.s.n.m.



◆ Pozo con nivel dinámico


Pozo sin datos sep21-dic22, jul23-dic23, jun26-sep26.

"HDA. MA. ISABEL (4)"




Región Atacama




Acuífero Río Copiapó - Sector Piedra Colgada/Angostura




UTM (WGS84) Norte: 6974181 m Este: 326692 m Altitud: 120 m.s.n.m.









◆ Pozo con nivel estático












"PARCELA EL BOLDO"

Región Valparaíso

Acuífero Río Petorca - Sector Río Petorca Oriente

UTM (WGS84) Norte: 6416151 m Este: 299326 m Altitud: 171 m.s.n.m.




◆ Pozo con nivel dinámico

"ASENTAMIENTO ALICAHUE"

Región Valparaíso

Acuífero Río La Ligua - Sector Estero Alicahue

UTM (WGS84) Norte: 6420044 m Este: 332977 m Altitud: 669 m.s.n.m.



◆ Pozo con nivel dinámico


Pozo sin datos sep21-mar22, may22-dic24, mar26-may26.

"FUNDO MONTEGRANDE"

Región Valparaíso

Acuífero Río La Ligua - Sector Río La Ligua Cabildo

UTM (WGS84) Norte: 6408237 m Este: 303177 m Altitud: 145 m.s.n.m.



◆ Pozo con nivel dinámico


Pozo sin datos ene26-mar26.

"PAPUDO Y ZAPALLAR"

Región Valparaíso

Acuífero Río La Ligua - Sector Río La Ligua Costa

UTM (WGS84) Norte: 6408321 m Este: 281486 m Altitud: 17 m.s.n.m.




◆ Pozo con nivel estático

"PERFIL SAN FELIPE"

Región Valparaíso

Acuífero Río Aconcagua - Sector San Felipe

UTM (WGS84) Norte: 6376616 m Este: 337533 m Altitud: 634 m.s.n.m.




◆ Pozo con nivel dinámico

"POZO RABUCO 2"

Región Valparaíso

Acuífero Río Aconcagua - Sector Nogales/Hijuelas

UTM (WGS84) Norte: 6362164 m Este: 302032 m Altitud: 294 m.s.n.m.




◆ Pozo con nivel estático

"ASENTAMIENTO LA VICTORIA (3)"

Región Valparaíso

Acuífero Río Aconcagua - Sector Aconcagua Desembocadura

UTM (WGS84) Norte: 6353675 m Este: 271693 m Altitud: 15 m.s.n.m.




◆ Pozo con nivel estático

"POZO FUNDO LA CATÓLICA"

Región Metropolitana

Acuífero Río Maipo - Sector Pirque

UTM (WGS84) Norte: 6273575 m Este: 352988 m Altitud: 666 m.s.n.m.




◆ Pozo con nivel dinámico

"FUNDO LOS TAHURETES"

Región Metropolitana

Acuífero Río Maipo - Sector Chacabuco Polpaico

UTM (WGS84) Norte: 6343563 m Este: 340306 m Altitud: 664 m.s.n.m.



◆ Pozo con nivel estático


Pozo sin datos jun23-sep23.

"POZO MISIÓN CORAZÓN DE MARÍA"

Región Metropolitana

Acuífero Río Maipo - Sector El Monte Nuevo

UTM (WGS84) Norte: 6272967 m Este: 321799 m Altitud: 340 m.s.n.m.




◆ Pozo con nivel dinámico

"POZO INDUSTRIA BATA"

Región Metropolitana

Acuífero Río Maipo - Sector Melipilla

UTM (WGS84) Norte: 6271385 m Este: 297570 m Altitud: 178 m.s.n.m.




◆ Pozo con nivel dinámico

"FUNDO SANTA FILOMENA"




Región O'higgins




Acuífero Río Rapel - Sector Graneros/Rancagua

UTM (WGS84) Norte: 6230758 m Este: 347661 m Altitud: 572 m.s.n.m.



◆ Pozo con nivel dinámico






"ESTADIO DE MOLINA"

Región Maule

Acuífero Río Mataquito - Sector Teno Lontué

UTM (WGS84) Norte: 6112376 m Este: 291362 m Altitud: 279 m.s.n.m.




◆ Pozo con nivel estático

"ESTADIO DE LINARES"

Región Maule

Acuífero Río Maule - Sector Maule Medio Sur

UTM (WGS84) Norte: 6029048 m Este: 266094 m Altitud: 147 m.s.n.m.




◆ Pozo con nivel estático

"CHILLÁN EN ESCUELA CAMINO A PINTO"

Región Ñuble

Acuífero Río Itata - Sector Ñuble

UTM (WGS84) Norte: 5938295 m Este: 234563 m Altitud: 208 m.s.n.m.




◆ Pozo con nivel estático

"NACIMIENTO EN PISCINA MUNICIPAL"

Región Biobío

Acuífero Río Bio-Bio - Sector Tavoleo

UTM (WGS84) Norte: 5846905 m Este: 704930 m Altitud: 85 m.s.n.m.




◆ Pozo con nivel estático

"LOS ANGELES EN CASA DE HUESPED MOP"

Región Biobío

Acuífero Río Bio-Bio - Sector Bío Bío Medio

UTM (WGS84) Norte: 5853112 m Este: 736527 m Altitud: 153 m.s.n.m.




◆ Pozo con nivel estático

"ESTADIO FISCAL EN TRAIGUEN"

Región La Araucanía

Acuífero Río Imperial - Sector Ríos Colpi Quillén

UTM (WGS84) Norte: 5764259 m Este: 703182 m Altitud: 175 m.s.n.m.




◆ Pozo con nivel estático

"VIVERO FORESTAL MAGASA EN CUNCO"

Región La Araucanía

Acuífero Río Toltén - Sector Toltén Alto

UTM (WGS84) Norte: 5686798 m Este: 758720 m Altitud: 375 m.s.n.m.



◆ Pozo con nivel estático


Pozo sin datos sep23-feb24, abr24-jun24.

"ESTADO MUNICIPAL DE MAFIL"

Región Los Ríos

Acuífero Río Valdivia - Sector Río Cruces

UTM (WGS84) Norte: 5621384 m Este: 674422 m Altitud: 27 m.s.n.m.




◆ Pozo con nivel estático

"MULTICANCHA VILLA LOS RÍOS EN LA UNIÓN"

Región Los Ríos

Acuífero Río Bueno - Sector Bueno Medio

UTM (WGS84) Norte: 5536692 m Este: 662500 m Altitud: 22 m.s.n.m.



◆ Pozo con nivel estático

